Pillangós MIX 05. évelő csávázatlan

Ajánlás: zöldtakarmány

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Életciklus: évelő

Norma: 20-30 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Vetésidő: tavasz-ősz

Vetésidő: tavasz-ősz

Összetevők:

70% lucerna 22% bíborhere 5% vöröshere 3% fehérhere

PRIMAG

Ez a évelő és áttelelő pillangósokra épülő rkeverék a talajtermékenység javítására, a gyomelnyomás erősítésére és a biológiai nitrogén-megkötés maximalizálására lett összeállítva. A komponensek eltérő növekedési eréllyel és gyökérzónával rendelkeznek, így együtt gyors talajtakarást, mélyreható talajszerkezet-javítást és tartós talajélet-fokozást biztosítanak.

Összetevők és agronómiai szerepük

- Trifolium pratense (vöröshere) – nagy zöldtömeg, erőteljes kezdeti fejlődés, kiváló gyomelnyomás és N-kötés.
- Trifolium incarnatum (bíborhere) – gyors őszi/tavaszi talajfedés, beporzó-barát virágzás.
- Medicago sativa (lucerna) – mélyre hatoló karógyökér, tömörödés oldása, kiváló szárazságtűrés.
- Trifolium repens (fehérhere) – kúszó habitus, tartós talajtakarás, állandó fedettség

Agronómiai előnyök, amelyek mérhetőek a gyakorlatban

- Intenzív biológiai nitrogén-megkötés: A herefélék és a lucerna szimbiózisa jelentős mennyiségű, a következő kultúra számára felvehető N-t halmoz fel.
- Többszintű gyökérzóna → jobb talajszerkezet: A lucerna mély, a vöröshere középmély, a fehérhere sekély gyökérzete együtt javítja a vízbefogadást, vízmegtartást és a levegőzöttséget.
- Gyors záródás, erős gyomelnyomás: A vöröshere tömege és a fehérhere kúszó szárai hatékony talajfedést adnak.
- Biodiverzitás és talajélet fokozása: A bíborhere és a vöröshere virágzása támogatja a hasznos

rovarokat és a talajmikrobiológiát.
- Széles körű talajadaptáció: Különböző talajtípusokon is stabil állományt képez.

Ajánlott felhasználási területek

- Zöldugar és talajregeneráló vetésforgó elem
- Ökológiai fókuszterületek, AKG/EFA célok
- Ültetvények sorköztakarása
- Regeneratív és ökológiai gazdálkodási rendszerek
- Méhlegelő és biodiverz élőhely kialakítás

Vetéstechnológiai javaslat

Vetésidő	kora tavasz vagy nyár vége – kora ősz
Vetésmélység	1–2 cm (apró magméret)
Vetés módja	aprómagvető / gabonavető
Ápolás	1–2 kaszálás a gyomok visszaszorítására

Várható hatások a következő kultúrában

- Csökkenthető N-műtrágya igény
- Javuló talajszerkezet és vízgazdálkodás
- Magasabb szervesanyag-tartalom
- Erőteljesebb talajbiológiai aktivitás
- Kiegyenlítettebb növényállomány a vetésforgóban

Ez a pillangós dominanciájú keverék nemcsak talajtakaró, hanem aktív talajépítő rendszer: javítja a talaj szerkezetét, növeli a humuszképződést és jelentős nitrogén-tartalékot hagy a következő növénykultúra számára. Ideális választás a fenntartható, talajközpontú növénytermesztésben.

PRIMAG
1991