

## Zöldugar 41. csávázatlan

**Ajánlás:** kettős hasznosítás

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan

**Jellemző:** fűtűlsúlyos

**Norma:** 20-30 kg/ha

**Státusz:** Előrendelhető

**Vetésidő:** tavasz-ősz

**Vetésidő:** tavasz-ősz

### Összetevők:

40% lucerna 40% nádkéjú csenkesz 20% angol perje



Magas lucerna tartalmú kaszálókeverék vetőmag.

AKG zöldugar támogatási formának megfelelő összetétel.

Csávázatlan vetőmagkeverék.

### Előnyei:

- A széna készítése sokkal egyszerűbb, mint a tiszta vetésű lucernánál
- Egyszerűen fenntartható kaszálótársulás
- Átlagos évben 3-5 alkalommal kaszálható
- A nagy pillangós arány javítja a talajéletet, a fűfélék pedig a talajszerkezetet
- A pillangósok a fűvek nitrogénellátását is biztosítják

Élőhely: célszerű problémás helyekre telepíteni (ahol domborzati vagy egyéb okok miatt az éven belüli többszörös szántóföldi művelés gondot jelent).

- Vetés időpontja: február-április, illetve szeptember.
- Vetésmélység: 0.5-1 cm.
- Vetőmagigény: 25-30 kg/ha.
- Betakarítás: a vetés évében az első kaszálás vagy szárazzás 8-10 cm-es tarlóval történjen; így az oldalhajtásokat növekedésre serkentjük. Későbbi kaszálásokkor is kerüljük a „borotválást”; 4-5 cm-es tarló mindenképp szükséges.
- Növényvédelem: biodiverzitás szegélyeken vegyszeres gyomirtást nem alkalmazhatunk!

Egyéb: száraz évjáratú telepítéskor mechanikai gyomirtási céllal az első kaszálás helyett mindenképpen szárazítás szükséges! A parlagfüves állományt július 1. előtt mindenképpen kaszálni vagy zúzni kell.



P R I M A G

— 1991 —