Zöldugar 43. takarmánykeverék csávázatlan

Ajánlás: zöldtakarmányozás

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Jellemző: fűtúlsúlyos

Norma: 20-30 kg/ha

Státusz: Elfogyott

Vetésidő: tavasz-ősz

Vetésidő: tavasz-ősz

Összetevők:

40% nádképű csenkesz 20% angol perje 15% vörös csenkesz 10% komlós lucerna 10% réti perje 5% fehérhere

Többéves legelő- és kaszálókultúra könnyen kiszáradó területekre.

- Csávázatlan vetőmagkeverék
- Évelő, 5-7 éves kultúra
- Homok- és szikes talajokon is jól fejlődik
- Kiemelkedően szárazságtűrő, de bírja az időszakos vízborítást is
- Termesztése környezetkímélő és költséghatékony
- A tarackos füvek csökkentik az eróziót
- Növényvédelmet nem igényel
- Évjárattól és hasznosítástól függően évente 1-4 kaszálást ad
- Magas beltartalmi értékek, jó emészthetőség és ízletesség jellemzi
- Hozama éves szinten 8-12 t/ha szárazanyag

Termesztéstechnológia

- Vetés ideje: március - április, illetve augusztus - szeptember.
- Vetőmagnorma: 25-30 kg/ha.
- Vetéselőkészítés: kertszerűen elmunkált, ülepedett magágy, amelyben cipősarok, traktorkerék nem hagy nyomot.
- Vetés módja: vetésmélység: 1 cm. Az új típusú vetőgépekkel vigyázzunk a mélységre, mert a nagy önsúly miatt mélyebbre kerülhet a mag, mint szeretnénk. Ha van a vetőgép előtt tárcsasor, azt vetés előtt mindenképpen emeljük fel.
- Vetés elmunkálása: az újabb típusú vetőgépeken van tömörítőhenger, így nem kell vetés

után hengerezni. Cserepesedésre hajlamos talajoknál tilos a hengerezés! Ha mégis szükséges a hengerezés, azt mindenkor a vetésre szöget bezárva végezzük el, és simahenger helyett bordás hengert használjunk.

- Tápanyagellátás: nitrogén hatóanyagból 50-70 kg. A javasolt felső határt ne lépjük túl, mert az a fehér here kiveszéséhez vezethet. A telepítés évében a szerves trágyát meghálálja.
- Betakarítás: első kaszálás májusban. A további kaszálások gyakorisága a csapadék mennyiségétől függ. Évente egy tisztító kaszálás elvégzése javasolt.

PRIMAG
1991