

Zöldugar 45. csávázatlan

Ajánlás: zöldtakarmányozás

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Jellemző: fűtűlsúlyos

Norma: 20-30 kg/ha


Státusz: Előrendelhető

Vetésidő: tavasz-ősz

Vetésidő: tavasz-ősz

Összetevők:

30% nádkéjú csenkesz 20% angol perje 15% svédhere 10% bíborhere 10% réti perje 10% olasz perje 5% fehérhere



PRIMAG

1991

Többéves szálas pillangós kaszálókultúra időszakosan vízállásos területekre.

Szenázs és szénakészítésre alkalmas keverék.

- Csávázatlan vetőmag
- Évelő, 5-7 éves kultúra
- Kedveli a nedves fekvésű területeket, tolerálja az időszakos vízborítást
- Faji összetétele révén talajvíz-gazdálkodás szempontjából heterogén területeken is biztos borítást ad.
- Magas beltartalmi értékek, jó emészthetőség és ízletesség jellemzi
- Termesztése környezetkímélő és költséghatékony
- Növényvédelmet nem igényel
- Évjárattól és hasznosítástól függően évente 2-4 kaszálást ad
- Hozama éves szinten 12-15 t/ha szárazanyag
- Vetés ideje: március - április, illetve augusztus - szeptember.
- Vetőmagnorma: 25 kg/ha.
- Vetéselőkészítése: kertszerűen elmunkált, ülepedett magágy, amelyben cipősarok, traktorkerék nem hagy nyomot.
- Vetés módja: vetésmélység: 1 cm. Az új típusú vetőgépekkel vigyázzunk a mélységre, mert a nagy önsúly miatt mélyebbre kerülhet a mag, mint szeretnénk. Ha van a vetőgép előtt tárcsasor, azt vetés előtt mindenképpen emeljük fel.
- Vetés elmunkálása: az újabb típusú vetőgépeken van tömörítőhenger, így nem kell vetés után hengerezni. Cserepesedésre hajlamos talajoknál tilos a hengerezés! Ha mégis

szükséges a hengerezés, azt mindenkor a vetésre szöget bezárva végezzük el, és simahenger helyett bordás hengert használjunk.

- Tápanyagellátás: nitrogén hatóanyagból 50-70kg. A javasolt felső határt ne lépjük túl, mert az a fehér here kiveszéséhez vezethet. A telepítés évében a szerves trágyát meghálálja.
- Betakarítás: a bíborhere és a hibrid here bimbós állapotától kezdve.



P R I M A G

— 1991 —