

## Aranymazsola Golden Bantam csávázatlan

**AKG:** AKG

**Csávázás:** csávázatlan

**Érésidő:** középkorai

**Státusz:** Rendelhető

**Típus :** szuperédes

### Standard konstans fajta, nem hibrid és nem génmódosított (GMO) fajta!

A Golden Bantam, más néven Aranymazsola, egy klasszikus, nyílt beporzású (nem hibrid) csemegekukorica fajta, amelyet már több mint egy évszázada természetnek világszerte. Különösen népszerű a házikertészek körében, mivel kiváló ízű, könnyen termeszthető, és a magja visszafogható a következő szezonzra. A Golden Bantam ideális választás azok számára, akik természetes, hagyományos ízvilágú csemegekukoricát szeretnének termeszteni saját kertjükben, miközben fontos számukra a fenntarthatóság és a GMO-mentesség.

- Legjobb teljes érésben szedve. Íze kellemes, édes. Népszerű házikerti fajta.
- Középkorai érésű, közepes csövű, hossza 16-18 cm, szemsorok száma 8.
- A mag közepes méretű, aranyárga színű, kellemes ízű. A csövek mennyisége és minősége csak megfelelő öntözés mellett lesz jó minőségű.
- Elsősorban friss fogyasztásra javasoljuk, de fagyasztásra is alkalmas.

Az Aranymazsola csemegekukorica tápanyagban dús talajt kíván, az öntözést meghálálja. Mindenképpen javasolt valamilyen gyomelnyomó technológia alkalmazása, ami a mulcsozástól a tökfélék sorközbe ültetéséig terjed. A kukorica mellé ültethetünk valamilyen futóbabot, mert a helykihasználáson túl a bab gyökerén élő nitrogén megkötő gombák mindkét növényt segítik. A kukorica vagy népies nevein tengeri, törökbúza, málé (*Zea mays*) a perjefélék családjába tartozó, lágú szárú, egylaki, vált ivarú, egynyári növény. Tulajdonképpen egy nagyra nőtt fű. Amerikában őshonos, Európába Kolumbusz közvetítésével került. Ma a legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényünk. Nálunk kizárólag szabad elvirágzású, természetes fajtákat találunk, amelyeknek magja vissza is fogható. Általában a kukorica magot közvetlenül vetik, miután a fagyveszély biztosan elmúlt. Mivel a kukoricát a szél porozza be, jobb, ha tömör csoportban van vetve és nem sorokban. A kukoricának sok tápanyagra és gazdag talajra van szüksége. Az amerikai-indián módszer, amely szerint elástak egy kukorica szemekkel teli halfejet, hatékony módja a nitrogénkoncentráció növelésének. Pár deka komposzt vagy fermentált trágya jó eredményt produkál.

### Vetés

Április közepétől június végéig. Korai vetésnél ügyeljen, hogy a talaj hőmérséklete megfelelő legyen. Ezért vetését csak 10-12 °C talajhőmérsékletnél tanácsos kezdeni, mivel a hideg talaj a csíra pusztulását okozhatja. Sortávolság: 70-80 cm, tőtávolság: 25-30 cm, vetésmélység: 3-5 cm, lazább

talajokon több. Optimális csírázási hőmérséklet 10-12 °C felett, csírázási idő: 12-20

## **Gondozás**

Főleg virágzáskor igényli az öntözést, de a teljes termesztési időszakban szükséges lehet, az időjárási viszonyok figyelembevételével. A szerveztrágyázást és a fejtrágyázást jobb minőségű termékkel és jelentős termés-többlettel hálálja meg. Gyakran kell öntözni, főleg, ha a levelek összezsavarodnak és a csövek dagadni kezdenek.

## **Betakarítás**

Szabadföldön: július második felétől szeptember végéig A szedését akkor kezdjük, amikor a szemek már a csó felső harmadában is kitelnek és világossárga színűek.

