

Balkányi 23

Státusz: előjegyezhető

Fajta neve: Balkányi 23

Típus: keserű

Vetésidő: nyári

Csávázás: csávázatlan

Szap. fok: I. fok

Norma: 100-150 kg/ha

Hasznosítás: zöldítés

Jellemző tulajdonságai :

- kettős hasznosítású keserű csillagfürt fajta
- fehérje tartalma a szójához hasonló, alkaloida mentesítés (kioldás) után a gazdasági haszonállatok takarmányozásában felhasználható
- a standardokhoz képest a legnagyobb zöldhozamot adja, 20-25 cm-rel magasabb mint a Vajai 1
- N gyűjtő: kb. 90 kg/ha kötött nitrogénnel gazdagítja a talajt
- a laza szerkezetű, **savanyú kémhatású talajok** nagy tömeget adó zöldtrágya növénye
- ezerszemtömege: 370 gr.
- a virágok színe: rózsaszín
- 2-3 emeletben képződnek a szemtermést adó hüvelyek, a teljes érés után sem pereg
- természetese műtrágyázás nélkül is megvalósítható, szerény adagú makroelemek adagolását meghálálja
- kártevők a gyakorlatban nem károsítják, a görbüléssel szembe fordított szárelhalás kórokozójával / Colletotrichum sp. /szemben eddig ellenálló
- a tenyészedőben - amely 160 nap - vegyszeres lombvédelmet nem igényel
- szemtermése - korai vetés esetén - 20-30 q/ha
- zöldhüvelyes állapotban bedolgozva a hektáronkénti zöldtömeg: 35-40 to
- ajánlott vetőmag norma magtermesztés esetén 100-150 kg/ha, zöldtrágya vetésre 200 kg/ha

Agronómiai ajánlások :

- a magtermesztéskor súlypontos a minél korábbi vetésidő. Amint a talaj művelhető állapotba kerül vetni kell, mert a megkésett vetés a szemtermést jelentősen csökkenti.
- a gyomirtási technológiát a fajtafenntartóval célszerű egyeztetni
- a betakarítás és vetőmag kezelése fokozott odafigyelést igényel
- tavaszi, fővetésű zöldtrágya vetés és annak bedolgozása után nyári, őszi vetésű növények termelhetők



PRIMAG
— 1991 —