

## Négermag

**Státusz:** Rendelhető

**Fajta neve:** Négermag

**Vetésidő:** nyár

**Csávázás:** csávázatlan

**Szap. fok:** keresk.

**Norma:** 10 kg/ha

**Ajánlás:** zöldítés

A négermag (nigermag, feketemag vagy mungó) a fészkesvirágzatúak családjába tartozó, a hűvösebb trópusi területek növénye.

Napjainkban Etiópiában és Indiában termesztik nagy területen, főként olajáért.

A két területen magasságban, termőképességben és olajtartalomban eltérő változatok terjedtek el. Európában és Amerikában madáreleségnek és zöldtrágyanövénynek használják

Egynyári növény, kb. 0,6-1,8 m magasra nő, a környezeti hatásoktól függően. A levelek 10-20 cm hosszúak, lándzsás alakúak.

A szár színe fajtától függően sötétlilától világoszöld lehet. Mérsékelten elágazó (5-12 db), enyhén érdes, lágyszárú. Virágai a hajtások végén fejlődnek, világos sárga színűek.

Rövidnappalos növény.

Gyökérzete a talaj felső 30-40 cm-ét szövö át.

A meleg, mérsékelten száraz és a nagy csapadék- (660-1790 mm) ellátottságú területeken is jól termeszthető.

Apró magja a csírázáshoz kevés nedvességet igényel. A laza és a nehéz agyagos talajokon is szépen fejlődik, az optimális pH 5,5-7,5 között van.

Önmagában vetve 5-10 kg/ha a vetőmagnorma, 2-3 cm mélységben, 36-50 cm-es sortávra. 3-5 napon belül csírázik.

Fejlődéséhez 13,6-27,5 0C szükséges, már a korai fagyok is károsítják. Zöldtrágyaként júliusban érdemes elvetni, ekkor augusztus végétől kezd virágozni, így nálunk nem képes magot érlelni.

Amennyiben a virágzás idején bedolgozásra kerül, a zöldtömeg könnyen lebomlik. Nagy előnye, hogy gyorsan fejlődik, jó gyomelnyomó képességű és erőteljes mikrohizsa rendszerrel rendelkezik.

A vetésforgó megtervezésekor figyelembe kell venni, hogy Rhizoctonia- és Sclerotinia-érzékeny.

Vetőmag norma keverékbe: 2-5 kg/ha