

Pohánka

A takarónövény nem csupán egy termék, hanem egy komplett technológia, amely csak folyamatos tanulással és megfigyeléssel lesz sikeres. A zöldtrágyázásnak köszönhetően regenerálódik a talaj, szerkezete és termékenysége javul. A zöldtrágya vetőmag segítségével, ökológiai másodvetéssel a zöldítés könnyen kivitelezhetővé válik. A talaj termékenységének megtartásával és javításával elérhető a növénytermesztés szintjének megőrzése. A zöldtrágya növények közül sok felhasználható az új [Agro-ökológiai Programban](#) is. A választható gyakorlatok tételes listáját [IDE kattintva](#) érheted el. Az AÖP-ben alkalmazható termékeket összegyűjtve [ITT találod meg](#).

Zöldtrágya növények és keverékeik széles kínálata 1 helyen! ... hogy járjon a 2 AÖP pont

Termék	STÁTUSZ	KISZERELÉS	NETTÓ EGYSÉGÁR
Hajnalka csávázatlan	Rendelhető	25 kg/zsák	454 Ft/kg
Lileja csávázatlan	Rendelhető	25 kg/zsák	509 Ft/kg
Zita csávázatlan	Rendelhető	25 kg/zsák	482 Ft/kg

PRIMAG
— 1991 —

A pohánka előnyös tulajdonságai

A pohánka szárazságtűrő növény, amely a gyengébb minőségű talajban is jól fejlődik.

[Zöldtrágya növényként](#) mustár, olajretek, valamint pillangósvirágúak társaságában hatalmas gyökértömeget növeszt, és szinergetikus hatással vannak egymásra. Facéliával is vethető, ha a termőhelyi viszonyok inkább csak átlagosnak mondhatóak, akkor kettejükkel hozható létre a legpozitívabb tulajdonságokkal rendelkező zöldtrágya. A zöldtrágyázással javul a talaj szerkezete, valamint termékenysége egyaránt.

A pohánka hasznosítása

A pohánka nem csak zöldtrágyaként hasznos. Zöldetetésre és magjai révén is alkalmas állatok takarmányozására, emellett pedig az emberi étkeztetésben is szerepet kap.

Az emberek kásának vagy liszt alapanyagként fogyasztják. Magas vitamin- és ásványianyag-

tartalommal rendelkezik, kiváló B-vitamin forrás. Gluténérzékenyek is fogyaszthatják, és magas rosttartalmának köszönhetően támogatja az egészséges emésztést.

Zöldetetésre akkor ajánljuk, ha virágzásában történik a betakarítása - ebben az esetben a vetést követő hatodik-hetedik hétben már hasznosítható. Érdeemes repcével vagy [lucernával](#) keverni a jobb ízek eléréséért. Magja lovak és baromfik számára alkalmas eledel.



P R I M A G

— 1991 —