

Élő sorköz csávázatlan

Ajánlás: szőlő

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Norma: 15-20 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Vetésidő: tavasz-ősz

Összetevők:

30% komlós lucerna 25% szarvaskerep 25% fehérhere 10% lándzsás utifű 5% tarka koronafürt 5% vadmuromok

Kizárólag évelő, és nem túl magasra növő növényfajokat választottunk ki, melyek illeszkednek a szőlőültetvény sajátosságaihoz. Megfelelő dózist alkalmazva, így biztosabban tud kialakulni már az első évre a kellő borítottság.

Olyan fajok kerültek a keverékbe, melyek minden borvidéket tekintve, több évig fennmaradtak a kísérleti szőlősorközökben, eredményesen újravetették magukat, s Magyarországon honosak.

A fajgazdagság révén, az eltérő gyökeresedési típusú, gyökeresedési mélységű növényfajok hozzájárulnak a talajtömörödés csökkentéséhez, a morzsalékos, kedvező talajszerkezet kialakulásához, a humusztartalom emelkedéséhez.

Fajgazdag sorköztakarás esetén a jól megválasztott növényfajok alkalmazásával a terület természetvédelmi értékét is növeljük és fokozzuk a terület biodiverzitását.

Az élő mulcsozással életteret biztosítunk a hasznos élő szervezetek számára is.

A technológia nemcsak ökológiai szőlőtermesztésben alkalmazható, de integrált művelésű ültetvények is sikerrel bevezethetők és fokozhatják vele fenntarthatóságukat.

Csapadékos időjárás esetén is jól bejárhatóan tartja az ültetvényt, emellett kedvező esztétikai hatást biztosít.

Vetési idő: **ősszel, vagy tavasszal április közepéig**

Vetési mélység: 1-3 cm

- Elérhető hatások:

- humusz gyarapítás
- tápanyag megőrzés
- talajtakarás
- erózió elleni védelem
- talajélet javítás
- hasznos szervezetek élettere
- gyomelnyomás



P R I M A G

— 1991 —