

Takarmány repce

A takarónövény nem csupán egy termék, hanem egy komplett technológia, amely csak folyamatos tanulással és megfigyeléssel lesz sikeres. A zöldtrágyázásnak köszönhetően regenerálódik a talaj, szerkezete és termékenysége javul. A zöldtrágya vetőmag segítségével, ökológiai másodvetéssel a zöldítés könnyen kivitelezhetővé válik. A talaj termékenységének megtartásával és javításával elérhető a növénytermesztés szintjének megőrzése. A zöldtrágya növények közül sok felhasználható az új [Agro-ökológiai Programban](#) is. A választható gyakorlatok tételes listáját [IDE kattintva](#) érheted el. Az AÖP-ben alkalmazható termékeket összegyűjtve [ITT találod meg](#).

Zöldtrágya növények és keverékek széles kínálata 1 helyen! ... hogy járjon a 2 AÖP pont

Termék	STÁTUSZ	KISZERELÉS	NETTÓ EGYSÉGÁR
Akela csávázatlan	Rendelhető	25 kg/zsák	1 069 Ft/kg
Gorilla csávázatlan	Előrendelhető	25 kg/zsák	
Licapo csávázatlan	Elfogyott	25 kg/zsák	

PRIMAG
— 1991 —

A takarmány repce előnyös tulajdonságai

A [zöldtrágyanövény vetőmagjai](#) között található takarmány repce kiváló köztesnövény, amely számos szempontból pozitív hatással bír a talajra. Zöldtrágyanövényként olyan értékes, mint az olajretek. A feletetés után a talajban maradó gyökérzet humuszban gazdaggá teszi a talajt és javítja annak szerkezetét.

Zöldtakarmányként is előszeretettel hasznosítjuk, a tejelő tehének számára is értékes takarmánynövény. Takarmányozásra már október kezdetétől vágható.

Augusztust elejétől szeptember közepéig vethető. Elő- és utóveteményre nem érzékeny.

A takarmány repce igényei

8-10 kg vetőmaggal szükséges számolni hektáronként. A termesztés technológia a többi repcére

jellemzőkkel megegyezik. Augusztusi vetéskor is figyelni kell arra, hogy némi csapadék mindenképpen szükséges vetéskor.

Takarmány repce termesztésekor gondolni kell a szükséges nitrogén tartalmú [műtrágyázás](#)ra is, ennek hatására magasabb fehérje tartalommal fog rendelkezni, javulnak a beltartalmi jellemzői, valamint később fog virágozni is.

Amennyiben zöldtrágyázás az elsődleges célja a termesztésének, akkor figyelni kell arra, hogy legkésőbb a virágzás kezdetekor fel kell aprítani és a talajba kell dolgozni.



P R I M A G

— 1991 —