

TillageMix Tas csávázatlan

Ajánlás: tápanyagmegkötés

Csávázás: csávázatlan

Norma: 10 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Típus : kifagyó

Vetésidő: nyár-ősz

Összetevők:

50% silócirok 45% pohánka 5% négermag



Talajlazítás a nyári hőségben is

Nyári keverékünkben a sziki kender pillangósként N-t fixál, és a szudánifűvel együtt gondoskodik a megfelelő zöldtömegről.

A Tillage Radish retek a tömörödött rétegek áttöréséért felel.

Mikor ajánljuk?

- repce után kalászos
- kalászos után kalászos
- kalászos után kukorica

Technológia:

- Vetésidő: július
- Vetés mélység: 2-3 cm
- Tenyészidő: 85-90 nap
- Terminálás: kifagyás

Mihez ajánljuk?

- Nitrogénmegkötés
- Zöldtömegelőállítás
- Zöldítés
- Könnyű kezelhetőség
- Talajlazítás

A **talajművelő retek** 10 hét alatt 1-1,5 méter mélyen képes gyökeret eresztetni, ezzel segítve a következő főnövény mélyebb gyökerezését, valamint a talaj vízháztartását. Ezen kívül képes felvenni és feltárni a fontosabb tápanyagokat a főnövényünk számára, mint a nitrogén, foszfor, kálium, kén, kalcium és bór.

A **silócirok** nagy gyökértömeget képez, ezzel növeli a talaj szervesanyag-tartalmát, valamint homok- és erodált vályogtalajokon kimondottan jó a talajjavító hatása.

A **négermag** és a silócirok jó szárazságtűrő növények, így a nyári nagy melegben is kiválóan tudnak kelni, és jó gyomelnyomó hatásuk van kellő sűrűségben vetve. A négermag ezen kívül jó kapcsolatot tud létesíteni a mikorrhiza gombákkal.

Mivel a silócirok és a négermag melegkedvelő növények, ezért a keveréknek ez a két komponense könnyen kifagy az első hideg periódusban, így tudnak még több teret adni a talajművelő retek fejlődésének.

Kiváló mulcsot képes maga után hagyni úgy, hogy a silócirok lassabb bomlása miatt hosszabb talajtakarást biztosít, míg a négermag és a talajművelő retek zöldtömege gyorsabban lebomlik.

Ezek a növények jól kiegészítik egymást, egy remek nyár közepi vetésű takarónövénymixet alkotnak.

