

Tillage Radisch csávázatlan

Ajánlás: zöldítés

AKG: AKG

Csávázás: csávázatlan

Norma: 20-25 kg/ha

Státusz: Rendelhető

Típus : részben kifagyó

Vetésidő: nyár-ősz

Összetevők:

31% pannon bükköny 30% borsó 29% zöld rozs 10% meliorációs retek



A keverék az ökológiai zöldítésben és az AKG programban zöldtárgya keverékként alkalmazható.

- Talajszerkezet javítás
- Humuszképzés

Mi a titok? A karógyökér!

Nincs még egy retek, amelyik ilyen mélyen és hatékonyan töri át a tömörödött talajrétegeket. Az akár 1,5 méterig hatoló gyökér felveszi és tárolja a tápanyagokat, valamint előkészíti a talajt a következő főnövénynek.

Ősszel hatékonyan veszi fel a nitrogént, káliumot és kén a talajból.

Masszív zöldtömegének köszönhetően elnyomja az őszi gyomokat, elpusztulása után pedig szétterül a talajon, így tavasszal is gyommentesen tartja a parcellákat.

Egyszerűen kontrollálható: három -10 Celsius fokos éjszakát követően elfagy. Enyhe telek esetén szárúzással vagy glifozát + 2,4-D gyomirtással terminálható.

Előnyök

- Könnyen kezelhető, gyorsan fejlődik (3-4 hét).
- A karógyökér képes 1-1,5 méter mélyre is lenyúlni, áttörve a tömörödött rétegeket, eketalpakokat.
- Felveszi és tárolja a "felesleges" N, P, Ca és egyéb tápelemeket.
- Három -10 Celsius fokos éjszaka alatt kifagy, így terminálása nem jelent gondot (enyhébb telek után 2,4-D és glifozát javasolt).
- Tavasszal gyorsan lebomlik, leadva a tárolt tápanyagokat a következő főnövénynek.

- Javítja a talaj levegőzöttségét és vízgazdálkodását.
- Elnyomja a fonálférgeket és gyomokat.

Vetés

Július közepe után vethető. 30-40 nap alatt is jelentős zöld- és gyökértömeget produkál, azonban az előnyök maximális kiaknázása érdekében érdemes legalább 10 héttel az első fagy előtt elvetni. Vetésmélység: 0,5-1,5 cm, lazább talajokban 2,5 cm
Vetőgép beállítása: lucerna



P R I M A G

— 1991 —